

Prophylaxezeitraum

Wann und wie lange muß man Malariamittel einnehmen?

Malariamedikamente haben unterschiedliche Dosierungsvorschriften und Anwendungsschemata.

Während einige Medikamente nur einmal wöchentlich zur Anwendung kommen, müssen andere täglich eingenommen werden. Da die Malariaerreger längere Zeit im menschlichen Blut überleben können, muß die Prophylaxe je nach Medikament bis zu vier Wochen nach Verlassen des Risikogebietes weitergeführt werden!

Beachte:

Expositionsbeginn ist der Tag der Einreise, Expositionsende ist der Tag nach dem Verlassen des gefährdeten Gebietes!

- **Chloroquin (z.B. Resochin®)**
Beginn regulär: spätestens 1 Woche vor Einreise in das Malariagebiet
Beginn "Last-Minute": 300 mg = 2 Tabletten an zwei aufeinanderfolgenden Tagen
Ende: 4 Wochen nach Verlassen des Malariagebietes

- **Proguanil (Paludrine®)**
Beginn regulär: 1-2 Tage vor Einreise in das Malariagebiet
Beginn "Last-Minute": 1 Tag vor Einreise in das Malariagebiet
Ende: 4 Wochen nach Verlassen des Malariagebietes

- **Mefloquin (Lariam®)**
Beginn regulär: 1 Woche vor Einreise in das Malariagebiet
Beginn "Last-Minute": Je 1 Tablette (250 mg) an drei aufeinanderfolgenden Tagen **)
Ende: 4 Wochen nach Verlassen des Malariagebietes

*) Mefloquin sollte bei erstmaliger Einnahme 2 - 3 Wochen vor der Abreise genommen werden, um eventuelle Nebenwirkungen und Unverträglichkeiten auszuschließen!

**) Kann nur für Personen empfohlen werden, bei denen bereits Erfahrungen mit der Verträglichkeit vorliegen

- **Atovaquon/Proguanil (Malarone®)**
Beginn regulär: 1-2 Tage vor Einreise in das Malariagebiet
Beginn "Last-Minute": 1 Tag vor Einreise in das Malariagebiet
Ende: 7 Tage nach Verlassen des Malariagebietes
- **Doxycyclin**
Beginn regulär: 1 Tag vor Einreise in das Malariagebiet
Beginn "Last-Minute": 1 Tag vor Einreise in das Malariagebiet
Ende: 4 Wochen nach Verlassen des Malariagebietes